

Suivre les indications portées sur ce document, remplir les renseignements demandés et remettre cette fiche avec le prélèvement au laboratoire.

### CONDITIONS DE PRELEVEMENT

De préférence, réaliser le prélèvement avant toute antibiothérapie.

Le matin au réveil, lors d'un effort de toux (kinésithérapie si besoin), cracher dans un flacon stérile fourni par le laboratoire et le refermer soigneusement.

### TRANSPORT

Apporter immédiatement le flacon au laboratoire à température ambiante.

### RENSEIGNEMENTS

Nom : ..... Prénom : .....

Date de naissance : .....

Date et heure du recueil : .....

Contexte :  Pneumopathie aiguë  
 Maladie pulmonaire chronique. Préciser : .....  
 Suspicion de tuberculose  
 Autre. Préciser : .....

Antibiothérapie :  Non  
 En cours. Précisez traitement et date de début : .....  
 Arrêtée. Précisez traitement et date d'arrêt : .....

Suivre les indications portées sur ce document, remplir les renseignements demandés et remettre cette fiche avec le prélèvement au laboratoire.

### CONDITIONS DE PRELEVEMENT

De préférence, réaliser le prélèvement avant toute antibiothérapie.

Le matin au réveil, lors d'un effort de toux (kinésithérapie si besoin), cracher dans un flacon stérile fourni par le laboratoire et le refermer soigneusement.

### TRANSPORT

Apporter immédiatement le flacon au laboratoire à température ambiante.

### RENSEIGNEMENTS

Nom : ..... Prénom : .....

Date de naissance : .....

Date et heure du recueil : .....

Contexte :  Pneumopathie aiguë  
 Maladie pulmonaire chronique. Préciser : .....  
 Suspicion de tuberculose  
 Autre. Préciser : .....

Antibiothérapie :  Non  
 En cours. Précisez traitement et date de début : .....  
 Arrêtée. Précisez traitement et date d'arrêt : .....